

DIFESA BIOLOGICA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013
COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO
Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA MONFERRATO CASALESE

Bollettino di difesa della vite n° 2 del 14.05.2018

Fase fenologica prevalente: **Grappoli separati**

BIOLOGICO

PERONOSPORA

Trattare

Anche se al momento non sono stati segnalati sintomi di peronospora, esistono le condizioni di pericolo per la partenza delle infezioni della malattia.

NON APPENA LA TRANSITABILITA' DEI TERRENI LO CONSENTE, INTERVENIRE con prodotti a base di RAME

Si rammenta il limite dei 6 Kg di rame metallo impiegabile per anno e per ettaro. A tal proposito si raccomanda di utilizzare prodotti a bassa concentrazione e basso dosaggio di Rame.

OIDIO

Trattare

La particolare sensibilità della vite in questa fase fenologica, induce a consigliare di unire all'antiperonosporico un prodotto antioidico a base di **Zolfo bagnabile**.

VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI

Coldiretti Casale M.to 0142 452840 - Coldiretti Cerrina 0142 943800
Confagricoltura Alessandria 0142 452209
Confederazione Italiana Agricoltori 0142 454617